



Sanichlor CHLORTABLETTEN



Sanichlor Tabletten sind schnell lösliche Chlortabletten. Das Produkt ist ein sehr effektives Bleichmittel und Desinfektionsmittel zur Sicherstellung der Hygiene in allen Bereichen der Lebensmittelherstellung.

Anwendungsgebiet: alle wasserbeständigen Oberflächen, außer Aluminium und Kupfer.


- **Sauber** Hohe Bleichwirkung und gute Zersetzung von Eiweißrückständen.
- **Sicher** Hygienesicherheit durch bakterizide und levurozide Wirkung.
- **Effizient** Maximales Hygieneniveau auch bei niedrigsten Konzentrationen.



ANWENDUNGSWEISE



5 DOSIERUNG		
1 TABLETTE IN	VERFÜGBARE AKTIV-CHLOR-KONZENTRATION	ANWENDUNG BEI
25 ml	12000 - 14000 ppm	Verschüttete Körperflüssigkeit & bei starker Verschmutzung
250 ml	1200 - 1400 ppm	Allgemeine Desinfektion
625 ml	480 - 560 ppm	WC's, Abflüsse, Spülen
1,25 l	240 - 280 ppm	Lebensmittelzubereitungsbereiche
2,0 l	150 - 175 ppm	Babyläschchen
2,5 l	120 - 140 ppm	Tücher & Wischbezüge



*Gem. BGV A1 ist bei Reinigungsarbeiten das Tragen von Schutzhandschuhen zu empfehlen.

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett, Sicherheitsdatenblatt und Reinigungs- und Desinfektionsplan beachten.
2. Alle losen Speisereste und Schmutz von der zu desinfizierenden Oberfläche entfernen.
3. Bei der Produkthanwendung stets geeignete Schutzausrüstung tragen.
4. Fläche gründlich mit Frischwasser nachspülen um losen Schmutz zu entfernen.
5. Bereiten Sie die Desinfektionslösung wie in der Tabelle dargestellt mit kaltem oder lauwarmem Wasser vor. Durch Rühren wird die Auflösungszeit der Tablette beschleunigt.
6. Anwendungslösung auf ein sauberes Tuch auftragen, damit die Oberfläche abwischen und auf ausreichende Benetzung achten. Kontaktzeit von mindestens 5-15 Minuten einhalten.
7. Fläche gründlich mit Frischwasser nachspülen.

HINWEIS:

FÜR JEDE ANWENDUNG EINE NEUE DESINFIZIERUNGSMITTELLÖSUNG HERSTELLEN.

DA DIE LÖSUNG TEXTILIEN AUSBLEICHT - VORSICHT VOR SPRITZERN. VERMEIDEN SIE LÄNGEREN KONTAKT MIT METALLEN.

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch. Verpackung nur leer und verschlossen entsorgen. Füllgutreste: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Angaben zum Biozidgesetz:


Aktive Substanz: 100 g SanichlorTabletten enthalten: 50 g Natriumdichlorisocyanurat.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch Produktetikett und Produktinformation lesen.

1 Tablette enthält 500 mg Natriumdichlorisocyanurat.

Nicht mit anderen Produkten mischen!

pH Wert (100 %)



LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern!

VERKAUFSEINHEIT

6 x 160 Tabletten 9065170
(20 Blister mit 8 Tabletten)